


**PadoTest®**

Zahnstelle: 17,24,26 / Taschentiefe: 9mm,8mm,9mm

| Marker | n      | ML   | Status |
|--------|--------|------|--------|
| Aa     | 0,37   | 0,1% | (★)    |
| Tf     | 5,38   | 1%   | ★★★    |
| Pg     | 3,91   | 0,7% | ★★★    |
| Td     | < 0,01 | -    | -      |
| Pi     | -      | -    | -      |
| Fa     | 0,79   | 0,2% | ★      |
| TBL    | > 200  | -    | ★★★    |
| TML    |        | 1,9% |        |

Auftreten & Konzentration der analysierten Markerkeime

Gesamtkeimzahl (TBL)



**Typ 5B**

starkes Vorkommen fakultativer Anaerobier (Aa) + strikte Anaerobier vorhanden


subgingivale Instrumentierung + AB

Metronidazol 400-500 mg + Amoxicillin 500 mg, je 3 x täglich für 7 Tage

Typ

Therapieempfehlung

Anteil Markerkeime (TML) im Tacho-Design



Alternativ ist eine regelmäßige Applikation des PerioChip® möglich.

**PadoSero**

Verteilung der Serotypen (Zahnstelle: 17,24,26)

| Marker | n    | Serotypen | Nachweis |
|--------|------|-----------|----------|
| Aa     | 0,37 | a         | x        |
|        |      | b         | -        |
|        |      | c         | -        |
|        |      | d         | -        |
|        |      | e         | -        |
|        |      | f         | -        |

**Aa Serotyp a**

nicht virulent, assoziiert mit parodontal gesunden Menschen

subgingivale Instrumentierung

keine Antibiotika-Therapie indiziert

Serotypisierung von Aa mit **iai PadoTest Plus**

**Ihre kombinierte Therapie**

Kombinierte Therapieempfehlung

**Typ 5B, Serotyp a**

starkes Vorkommen fakultativer Anaerobier (Aa) Serotyp a, strikte Anaerobier vorhanden

subgingivale Instrumentierung + AB (Metronidazol)

Metronidazol 400-500 mg, 3x tägl. für 7 Tage

**Darstellung der Schwere der Typen mittels Ampelfarben:**

- **Typ 1 + 2A** Keine Indikation für Antibiotika
- **Typ 2B + 3A** Optional adjuvante Antibiotika/Antiseptika, nach Klinik
- **Typ 3B - 5B** Indikation für adjuvante Antibiotika/Antiseptika